


Inventarisatie Vogels Noorder IJplas


- Vijftig telpunten, 25 aan elke kant van de snelweg (uiteindelijk leken 2 telpunten onbereikbaar)
- Basis was de MUS-methode van SOVON:
 - Vijf minuten per telpunt
 - Alle vogels zien én horen
 - Noteer het hoogst aantal *tegelijk* waargenomen exemplaren per soort
 - Elk telpunt 's ochtends bezocht in april, mei en juni
- Aangevuld met:
 - Gezien, gehoord of alleen de App
 - Aantal
 - Geslacht (waar mogelijk)
 - Oriëntatie ten opzichte van telpunt
 - Broedindicatief gedrag



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Broedindicatief gedrag:


- 1: vogel op of bij een voor broeden geschikte locatie
- 2: paartje op of bij een voor broeden geschikte locatie
- 3: broedterritorium-indicatieve waarneming (zang, verjagen soortgenoten)
- 4: nest-indicatieve waarneming
- 5: nest gezien
- 0: vogel aanwezig, maar geen broedindicatief gedrag



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Beperkingen:

- Vijf minuten per telpunt is kort, al was er geregeld wat uitloop
- Er zijn veel meer vogels gehoord dan gezien, wat zorgt voor een bias naar:
 - Vogels die luid zingen
 - Vogels die het gehele broedseizoen zingen
 - Vogels die vrijwel continu zingen
- Vogels met zachtere zang, of die een kortere periode territoriaal zingen, zijn minder snel opgemerkt




Inventarisatie Vogels Noorder IJplas



2 – Tjiftjaf

63 waarnemingen in telronde 3
Vrij gelijke verdeling over de telrondes



1 - Meerkoet:

115 waarnemingen in telronde 3
Zwaartepunt in laatste telronde



3 – Winterkoning

62 waarnemingen in telronde 3
Gestage toename per telronde

Welke drie vogels denken jullie dat het meest in één telronde zijn
waargenomen?

Inventarisatie Vogels Noorder IJplas


- Ook veel waargenomen landvogels: ekster, merel, roodborst, groenling, zwartkop, houtduif, koolmees, zanglijster
- Watervogels: grauwe gans, fuut, kraakeend, kuifeend, zilvermeeuw, wilde eend
- Exoten: halsbandparkiet, nijlgans, grote Canadese gans, grote Alexanderparkiet
- Bijzonder: ijsvogel, grote bonte specht, lepelaar, dodaars, appelvink, goudvink, kleine plevier
- De telpunten rond de Noorder IJplas leverden 66 soorten op, die aan de andere kant van de snelweg 46 soorten
- In totaal: 1389 waarnemingen van 1903 vogels verdeeld over 75 soorten



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas



Vergelijking met vogelonderzoek uit 2007:

- 9 vogelsoorten van toen zijn niet meer waargenomen, met name vogels die gebonden zijn aan brede rietkragen en verlanding, kale oevers en zandplaten
- 51 vogelsoorten die toen niet zijn waargenomen, zijn er nu wél, met name vogels van open water, struweel, park en bos, en bebouwing
- Bij deze vergelijking is alleen gekeken naar aan- of afwezigheid, en niet naar mogelijke aantallen



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas


- Aan de ene kant is er een hoge soortenrijkdom aan vogels, aan de andere kant domineert een klein aantal soorten met relatief zeer veel waarnemingen
- Met name van park en bos- en struikvogels zijn er veel exemplaren van relatief weinig soorten
- Verdwenen riet- en verlandingsvogels zijn onder andere grote karekiet, baardmannetje, snor en sprinkhaanrietzanger
- Nog wel aanwezig: kleine karekiet, bosrietzanger, Cetti's zanger en blauwborst
- Opvallende afwezig in het bos zijn havik en sperwer, waarvoor de habitat wel geschikt is en die hier in het verleden wel gezien zijn



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met
een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

?




Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

Kneu

- Vooral waargenomen in het struweel langs het Noordzeekanaal
- Liefhebber van struiken en halfopen landschap
- Nederlandse populatie zit vooral in de duinen en kleinschalig akkerland



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met
een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

?



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

Nachtegaal

- Vooral waargenomen in het struweel en jonge bos ten zuidoosten van de kleine plas
- Liefhebber van dichte struiklaag
- Nederlandse populatie zit vooral in de duinen



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met
een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

?



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

Staartmees


- Verspreid over het hele onderzoeksgebied, ook in het struweel rond de sportvelden
- Liefhebber van bossen en parken
- Nederlandse populatie zit vooral op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Oost Brabant en de duinen



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met
een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

?



Inventarisatie Vogels Noorder IJplas

Vaker dan één keer waargenomen broedvogel met een zeer ongunstige Staat van Instandhouding:

Turkse Tortel

- Waargenomen in het volkstuincomplex NoordOogst
- Liefhebber van door mensen gecreëerde leefomgeving als tuinen en parken
- Nederlandse populatie zit vooral rondom steden, maar niet veel in Amsterdam

